n.° 14.

par M. Davon
lieutenant du
1.er chirurgien
à Lavaur.

Observation dune Playe Darme a feu a Bout touchant auprés de Langle de La machoire inferieure, avec fracas de Lórbite et Láuil emporté par M.r D...

Le 10. juin 1771. je fus appellé a quatre heures du matin, pour panser joseph Laurent, ouvrier en Soye, agé de 14 ans, qui venoit de Recevoir un coup de fusil a Bout touchant, chargé de menu plomb, dont Léntrée etoit auprés de Langle de La machoire inferieure du coté droit, et La Sortie par Lórbite, avec fracture et Láuil du meme coté emporté. Le Blessé etoit Sans connaissance, ni mouvement, enfin dans un assoupissement Letthargique; ayant Son pouls trés petit et concentré, avec un gonflement dans toute La face et au col. ma premiere question, fut de minformer, de La Situation ou il etoit, Lorsquil Receut Le coup. on me dit, quil etoit assis Sur une chaise Basse, Le corps courbé en devant, occupé a Boucler Ses Souliers. de la je compris, que La charge etoit passée Sous Larcade zigomatique; ayant Sa Sortie a La partie moyeñe et Lateralle externe de Lórbite. touts Les Spectateurs Le crurent mort

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 59
n.° 41

Je Lui fis avaler un peu de vin pour Le
Ranimer. comme ce garcon etoit pauvre, on Le
transporta a Lhopital de cette ville. on me pria
Den avoir Soin, je Le fis avec Lagrement de Mr.
patricot chirurgien dud hopital; on métant
Rendu, je visitai attentivement Le Blessé. je
trouvai une playe Ronde, prés de Langle de La
machoire inferieure du coté droit, qui etoit fermée
par un tampon, que formoint Ses cheveux;
Du volume dun Bouchon de Bouteille ordinaire.
je dilatai haut et Bas cette playe, qui navoit
presque pas Rendu du Sang. je Sortis Le
tampon, qui avoit penetré dans Le trajet, de
La Longueur dun travers de doigts. jéxaminai
La Sortie, qui etoit plus grande que Lentrée.
Les paupieres etoint dechirées, formant
plusieurs Saillies en dehors. La varieté des
coups de feu, presente des cas, ou on ne doit
pas dilater Les playes, Lorsquelles passent au
visage: ce qui me determina, a tirer Seulement
quelques petites esquilles. je fis passer dans
Le trajet un petit Seton, pour faciliter La
chute de Lescarre et des esquilles. ce ne fut
pas Sans Beaucoup de peine que je parvins
a Lintroduire, a cause du gonflement
considerable de La partie. je fis mon

pansement avec de La charpie Brute et Seiche, par dessus des compresses trempées dans Léau de vie, que je contins par un Bandage artistement fait. pour calmer Les premiers accidents et prevenir ceux qui pourroint Survenir. je fis Saigner Le malade cinq fois dans Les vingt et quatre heures, trois au Bras et deux au pied. pour Regime, un Bouillon Leger, pour Boisson, une ptisanne avec Le chiendent; Sur chaque pinte de Laquelle, on mettoit un gros de Sel de nitre. Le Landemain je trouvai Son pouls Developpé, il avoit La fievre et quoique toujours assoupi, il Se plaignoit par fois. je Le fis encore Saigner trois fois au pied, dans LinterValle de vint et quatre heures. Le troisieme Jour il nétoit pas Si assoupi, il Repondoit quand on Linterrogeoit et Se plaignoit dún grand mal de tete. je Levai tout Lappareil, je Le Renouvelai, en imbibant tout Le Seton qui devoit traverser La playe, avec de Lésprit de therebentine. Les Bourdonets et Les plumaceaux etoint trempés dans La meme Liqueur. La playe Inferieure fut pansée avec des Bourdonets molets et des plumaceaux chargés dún digestif, fait avec Six onces de therebentine, trois onces de Beaume dárceus, deux onces de Suppuratif.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

une once d'onguent Stirax, une once d'huile d'hipericum et trois cueillerées d'eau de vie. j'appliquai un cataplasme avec La pulpe des herbes emollientes, et Les quatre farines resolutives, que je faisois Renouveller trois fois par jour, par dessus tout Le gonflement, et dans Le cour de La journée je Le fis Saigner deux fois au pied. je fis Les memes pansements matin et Soir, et il n'arriva Rien de Remarquable jusques au huitieme jour, que La Suppuration plus abondante, entraina inferieurement deux esquilles, de La grosseur de deux Lignes. Le neuvieme, une portion de L'escarre tomba, et entraina une esquille Semblable aux premieres. Le dixieme La fievre et Le gonflement diminuerent Beaucoup. je Reconnus alors distinctement, que Le zigoma n'avoit pas eté fracturé. Le quinzieme, je Retirai Le Seton, et je Supprimai Le cataplasme. je fis des injections, avec Le vin mielé, a La playe inferieure et je Remplis Le vuide de L'orbite, avec des Bourdonets molets trempés dans Le vin. je continuai Le meme pansement, jusqu'au vingt. Les paupieres qui etoint dechirées, Suppurerent peu, et furent Bientot cicatrisées, enfin aprés cinq Semaines, aprés avoir eté Saigné Seize fois tant au Bras qu'au pied, Le malade Sortit de L'hopital, parfaitement gueri. cinq mois aprés, il vint me trouver. Ses paupieres Suppuroint, Les ayant examinées, j'en Retirai une Esquille de La grosseur d'un aricot. c'etoit une portion du Rebord inferieur de L'orbite. depuis ce tems il ne S'est plaint de Rien. ——